



Las recomendaciones frente a VRS se valorarán para cada temporada.

 Vacuna hexavalente.

 Vacuna DTPa / VPI.

 Vacuna tetravérica.

 Administrar en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad.

 Administrar en determinadas condiciones.

1 HEPATITIS B

Se vacunará a los 2, 4 y 11 meses con la vacuna hexavalente. En recién nacidos de madre con AgHBs positivo o sin cribado, se administrará una dosis de vacuna frente a HB junto con una dosis de inmunoglobulina anti-HB en las primeras 24 horas de vida. Captación activa a personas no vacunadas.

2 DIFTERIA, TÉTANOS, TOSFERINA

Una dosis de vacuna dTpa en cada embarazo (preferentemente en la semana 27-28). Vacunación a los 2, 4 y 11 meses con vacuna hexavalente, como primovacunación y refuerzo. Refuerzos a los 5-6 años con DTPa/VPI y a los 14 años con Td. Dosis de recuerdo con Td en torno a los 65 años.

3 POLIOMIELITIS

Vacunación a los 2, 4 y 11 meses con vacuna hexavalente, como primovacunación y refuerzo. A los 5-6 años, vacuna combinada DTPa/VPI para completar la vacunación con una cuarta dosis.

4 ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA

Vacunación infantil con vacuna conjugada 20-valente (VNC20) a los 2, 4, 6 y 11 meses. En mayores de 65 años y grupos de riesgo: según protocolo vigente.

5 ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

Vacunación con MenB a los 2, 4 y 12 meses. MenACWY a los 4 y 12 meses (sustituye a MenC). MenACWY a los 12 años, con captación activa hasta los 18 años. Vacunación en grupos de riesgo según protocolo vigente.

6 SARAMPIÓN, RUBEOLA, PAROTIDITIS, VARICELA

Vacuna triple vírica TV, vacuna tetravírica SRPV. Primera dosis de TV a los 12 meses. Primera dosis de Varicela a los 15 meses. Segunda dosis entre los 2 y 4 años, en forma de SRPV (vacuna tetravírica). Revisión activa de estado vacunal frente al sarampión en todos los contactos de la población con el sistema sanitario. Contraindicada en embarazadas y personas inmunodeprimidas.

7 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Una dosis a niñas y niños a los 12 años. Captación de varones nacidos entre 2005 y 2010, y rescate de mujeres no vacunadas, hasta los 21 años. Vacunación en grupos de riesgo según protocolo vigente.

8 GRIPE

En el embarazo, en cualquier trimestre, y en el puerperio. En población infantil, **de 6 a 71 meses**, una dosis por temporada (vacuna inactivada intramuscular entre 6 y 23 meses y, preferentemente, vacuna intranasal de virus vivos atenuados entre 24 y 71 meses). A partir de los 60 años, una dosis anual. Asimismo, se recomienda la vacunación frente a la gripe en las **personas pertenecientes a grupos de riesgo**, incluyendo aquellas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, renales, hepáticas, neurológicas o inmunosupresoras), **personal sanitario y sociosanitario**, trabajadores de servicios esenciales, convivientes de personas inmunodeprimidas o mayores, y otros colectivos indicados en las instrucciones anuales de la Dirección General de Salud Pública.

9 VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL

Inmunización de lactantes con anticuerpo monoclonal frente VRS según pauta vigente. En adultos, vacunación estacional en ≥ 60 años residentes en centros de personas mayores y ≥ 18 años trasplantados de pulmón/cardiopulmonar o de progenitores hematopoyéticos, coincidiendo con la campaña de gripe y COVID-19.

10 ROTAVIRUS

Se administrarán 2 dosis (RV1 2-4 meses) o 3 dosis (RV5 2-4-6 meses) de acuerdo con la pauta recogida en la ficha técnica de la vacuna utilizada, respetando la edad máxima de vacunación según la ficha técnica del preparado vacunal utilizado.

11 COVID-19

En el embarazo, en cualquier trimestre. Una dosis anual a las **personas de 70 años o más**, de acuerdo con la campaña estacional de vacunación. Asimismo, se recomienda la vacunación en los grupos de riesgo definidos por la Dirección General de Salud Pública y en el **personal sanitario y sociosanitario**, así como en otras personas con condiciones de vulnerabilidad o exposición profesional, conforme a las instrucciones anuales vigentes.

12 HERPES ZÓSTER

Dos cohortes por año a los 65 y 80 años. Pauta de dos dosis (0-2 meses). Vacunación en grupos de riesgo según protocolo vigente.